

**Kamica pęcherzyka żółciowego** w badaniu USG jest łatwo wykrywalna z powodu dobrej dostępności pęcherzyka żółciowego. Pęcherzyk żółciowy położony pod prawym łukiem żebrowym znajduje się dosyć płytko i rzadko bywa przysłonięty przez gazy jelitowe.

Bardzo ważne jest [odpowiednie przygotowanie się do badania](#) . Przede wszystkim nie należy spożywać pokarmów na 3-4 godziny przed badaniem USG, ponieważ pęcherzyk żółciowy w odpowiedzi na dostarczone pożywienie wyrzuci do jelita żółć niezbędną do trawienia pokarmu, opróżniając się. W pustym pęcherzyku żółciowym również można zobaczyć kamienie żółciowe, jednak pełna jego ocena jest niemożliwa.

Kamienie żółciowe/ kamica pęcherzyka żółciowego jawi/ą się w badaniu USG jako zwykle owalne, jasne odbicia o różnej wielkości , luźno przesuujące się w pęcherzyku żółciowym. Mniejsze kamienie mogą bezpośrednio wpadać do dróg żółciowych, zatykać je i wywoływać kolkę żółciową. Kolka żółciowa może być wywołana również okresowo kamieniem przytykającym ujście żółci na poziomie szyi pęcherzyka.

{jcomments on}